

VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRA

A böjti récével - 2025-ben az év madarával – ismerkedtünk meg. Montázst alkottunk, majd elhelyeztük a saját élőhelyén.

- Megbeszéltük a böjti réce testfelépítését, életmódját, élőhelyét.
- Kiemelten megfigyeltük a tollazatának a színét, az élőhelyén, előfordulásán megtalálható növényeket.
- Megbeszéltük a víz felszíni, a víz alatti és feletti világot.
- Kiemelt figyelmet fordítottunk a kép komponálására, a térkitöltésre.
- Alkalmazott technikák: színezés, vágás, ragasztás, továbbrajzolás, festés.
- Felhasznált anyagok, eszközök: papír, olló, ragasztó, fénymásolt képek, alkoholos filc, színes ceruza, színes filc, zsírkréta, akvarell festék, anilin.


Ebben az órában volt a komplex tanulmányi verseny is, amin a nagyon jó rajzosok vettek részt.

Az órán a PPT anyaga:

A **böjti réce** a récefélék családjába tartozó, viszonylag kis termetű vízimadár. Magyarországon szórványos fészkelő, tavasszal a böjti szelekkel érkezik. Euráziában és Afrikában fordul elő, különösen a mocsaras, sekély vízű területeken. Hazánkban egészen 2004-ig vadászható volt, de állományának csökkenése indokoltá tette természetvédelmi oltalmát, így 2008-tól védett, jelenleg fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 Ft.





A **böjti réce hímje** jellegzetes színű és mintázatú, míg a tojók sokkal szerényebb megjelenésűek. A gácsérok (hímek) nászruhában feketésbarna fejtetővel és fehér szemöldöksávval rendelkeznek, mely a szem mögött folytatódik, egészen a tarkóig. Háta szürkésbarna, a tollak szegélyei világosak, hasoldala fehéres. Szárnytükrén zöldesszürke sáv húzódik fehér szegőkkel. A **tojók és a fiatal egyedek** háta szürkésbarna, szemsávja sokkal halványabb, mint a hímé, begye sárgásfehér. A faj kisméretű, testhossza 37-41 cm, szárnyfesztávolsága pedig 59-67 cm.




Előszeretettel **táplálkozik** sekély tocsogókon, főleg magokat, zöld növényi részeket és gerincteleneket fogyaszt. Táplálékának jelentős részét teszik ki a különböző rovarok, lárvák, férgek és csigák, amelyeket a sekély vízben keresgél. Emellett algákat és vízi növények leveleit is fogyasztja.



Leggyakrabban a szikes síkvidéki mocsárréteken, a nedves réteken, a szikes tavakon, a nyílt vizekkel tarkított és ritkás növényzettel benőtt tocsogókban, a kubikgödrökben és az **előntött mezőgazdasági földeken** telepszik meg. Vonuláskor is hasonló élőhelyeken jelenik meg, de előfordul a mély vizű tavakon és folyókon is.





Az osztály által választott legjobb alkotások készítőivel:



Még ezek után „csinosítottak” egyesek a munkájukon a térkitöltésnek megfelelően. A legszebb munkákat fotóztam le:



Napköziben beszélgettünk a fenntartható fejlődésről. Mi mit tehetünk ez érdekében? Tárgyakat csoportosítottunk, szelektáltunk anyagaik szerint. Beszélgettünk a szeméttelés megelőzéséről, a hulladékgazdálkodásról, a szemét felhalmozódásának következményeiről szintén néztünk képeket, videókat a szárazföldön és a folyókban, tengerekben előforduló olaj és műanyagszennyezés következményeiről. Majd szemétszedő versenyt rendeztünk a tantermen belül. Beszéltünk saját és mások testi és szellemi épségéről, a helyes táplálkozásról és az energia pocsékolás megakadályozásáról.

Rozmisné Tóth Anita